



Avant la grossesse

- Prise de sang conseillée pour :
 - Groupe sanguin + RAI (Recherche d'Agglutinine Irrégulière)
 - Toxoplasmose
 - Rubéole
 - VIH (population à risque)
- **Dépistage du cancer du col de l'utérus** (si le dernier a été effectué il y a 3 ans)
 - PCR HPV si la femme est âgée de plus de 30 ans ou examen anatomopathologique si la femme est âgée de moins de 30 ans



[en savoir plus](#)

Grossesse 1er trimestre

- **Prise de sang pour :**
 - **Toxoplasmose**
 - **Rubéole**
 - **Dépistage syphilis**
 - **Rhésus foetal à partir de la 11ème semaine si mère RhD- et conjoint +**
 - VIH (proposé systématiquement)
 - Hépatite B (antigène HBs)
- **Détermination du groupe sanguin / RAI**
- Glycémie à jeun (si facteur de risque de diabète gestationnel)
- **Analyse de la glycosurie et la protéinurie**
- Dépistage T21

Grossesse 2ème trimestre

- **Prise de sang pour :**
 - **Toxoplasmose (tous les mois si la patiente est séronégative)**
 - **Rubéole (si négative à la première prise)**
- **Analyse de la glycosurie, de la protéinurie**
- **Dépistage infection urinaire asymptomatique à la bandelette urinaire**
- **ECBU - Examen Cytobactériologique des Urines**
Si antécédents d'infection urinaire, diabète ou BU+
- Rattrapage du dépistage T21 s'il n'a pas été fait au 1er trimestre
- Dépistage diabète gestationnel par HGPO 75g (au 6ème mois si facteur de risque)

PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DU BIOLOGISTE DANS LES ÉTAPES CLÉS DES 1000 PREMIERS JOURS



Grossesse 3ème trimestre

- **Prise de sang pour :**
 - **Toxoplasmose (si négative à la première prise)**
 - **Rubéole (si négative à la première prise)**
- **Analyse de la glycosurie, de la protéinurie**
- **NFS (Numération Formule Sanguine) et RAI**
- Dépistage mensuel infection urinaire asymptomatique à la bandelette urinaire
- Prélèvement vaginal avec recherche de streptocoque B

Après la naissance - 1ères semaines

- Prise de sang pour la toxoplasmose si la patiente est séronégative
- En cas de diabète gestationnel - glycémie à jeun ou HGPO
- **Dépistage du cancer du col de l'utérus** (si le dernier a été effectué il y a 3 ans)

Bébé grandit : 3 à 9 mois

- Prise de sang selon prescription médicale

Bébé grandit : 9 mois à 2 ans

- Prise de sang selon prescription médicale